

تأثیر بیوچار بقایای گندم بر شاخص‌های میکروبی و تنوع‌زیستی ریزجانداران خاک و نقش آن در تحریک رشد گیاهی

چکیده

تنوع‌زیستی ریزجانداران خاک به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی سلامت خاک و عملکرد اکوسیستمی، تحت تأثیر عوامل مدیریتی از جمله استفاده از اصلاح‌کننده‌های آلی قرار دارد. این پژوهش در فروردین ۱۴۰۳ به مدت ۲ ماه با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف بیوچار بر شاخص‌های میکروبی، تنوع‌زیستی ریزجانداران خاک و رشد گیاه چاودار (*Secale montanum*) در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. بیوچار مورد استفاده از بقایای کاه و کلش گندم در شرایط پیرولیز (دمای ۳۵۰ درجه سانتی‌گراد، به مدت ۴ ساعت) تهیه گردید و در چهار سطح (۰، ۱، ۳ و ۵ درصد وزنی) به گلدان‌هایی حاوی ۴۰۰ گرم خاک لومی اضافه شد. در ۲۱ نمونه گلدانی، بذور چاودار کاشته شد و برخی نمونه‌ها به عنوان تیمارهای بدون گیاه در نظر گرفته شدند. نمونه‌ها به مدت ۶۰ روز تحت شرایط گلخانه‌ای نگهداری شدند و پس از آن، ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی خاک و شاخص‌های رشد گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. افزودن بیوچار منجر به افزایش قابل‌توجه در رشد گیاه شد. وزن تر بوته‌ها از ۰/۳ گرم در تیمار شاهد به ۰/۵ گرم در سطح ۵ درصد بیوچار افزایش یافت. همچنین pH خاک از ۷/۶۵ (شاهد) به ۷/۸۳ در سطح ۱ درصد بیوچار رسید. هدایت الکتریکی نیز در تیمارهای دارای گیاه و بیوچار به‌طور معنی‌داری بیشتر بود. از نظر میکروبی، نرخ تنفس خاک از ۰/۱۲ mg CO₂/gr.day در سطح ۱ درصد به ۰/۱۶ mg CO₂/gr.day در سطح ۳ درصد افزایش یافت. به‌طور کلی، تیمارهای دارای گیاه چاودار تغییرات بیشتری در ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی خاک نسبت به تیمارهای بدون گیاه نشان دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد بیوچار، به‌ویژه در سطوح بالاتر، نه تنها موجب بهبود شاخص‌های میکروبی خاک مانند تنفس و pH شد، بلکه توانایی خاک در حمایت از رشد گیاه را نیز افزایش داد. این یافته‌ها حاکی از آن است که بیوچار می‌تواند به عنوان یک اصلاح‌کننده مؤثر برای ارتقای کیفیت زیستی خاک و افزایش کارایی تولید گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: بیوچار، تنوع‌زیستی، گیاه چاودار، شاخص میکروبی.

مقدمه

خاک، ترکیبی پیچیده از ذرات معدنی، مواد آلی، آب و هوا، زیستگاه اصلی انواع میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌ها، قارچ‌ها، آکتینومیسیت‌ها، پروتوزوآها و ویروس‌ها است (Adekiya et al., 2019). این موجودات نقش مهمی در تجزیه مواد آلی به عناصر مغذی حیاتی مانند نیتروژن، فسفر و کربن دارند که برای رشد گیاهان ضروری‌اند. برخی باکتری‌ها مانند ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن جوی موثرند و قارچ‌های میکوریزا با همزیستی با ریشه گیاهان جذب آب و مواد مغذی را افزایش می‌دهند و مقاومت گیاهان را بهبود می‌بخشند. میکروارگانیسم‌ها همچنین در تجزیه آلاینده‌ها و حفظ تعادل محیط‌زیستی خاک نقش دارند که به حفظ حاصلخیزی و پایداری اکوسیستم‌های زمینی کمک می‌کند (Hu et al., 2023). چرخش عناصر و تجزیه مواد آلی که از مهم‌ترین فرایندهای اکولوژیکی در اکوسیستم خاک محسوب می‌شود. تنفس یکی از مهم‌ترین فرایندهای بیولوژیکی خاک است که توسط ریز جانداران خاک صورت می‌گیرد (Landi et al., 2000). تنفس ریز جانداران همانند گیاهان با مصرف اکسیژن و رهاسازی دی‌اکسید کربن همراه است که یک فرایند انرژی‌زا است و طی آن ترکیبات آلی با مبادله جفت الکترون‌ها، اکسایش پیدا کرده و دی‌اکسید کربن تولید می‌شود. این فرایند توسط سلول‌های باکتری‌ها، قارچ‌ها، جلبک‌ها و پروتوزوآهای خاک صورت می‌گیرد و در صورتی که در خاک تهویه به خوبی انجام نگیرد، بین ریز جانداران و گیاهان برای به دست آوردن

فاطمه عطار شهرکی^۱

نسرين قرهی^{۲*}

رسول زمانی احمد محمودی^۲

صاحب سودایی مشائی^۳

الهام قهساره اردستانی^۴

محسن بهمنی جونقانی^۵

۱. دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.

۲. دانشیار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.

۳. استادیار گروه مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.

۴. دانشیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.

۵. دانشیار گروه مهندسی صنایع ملمان، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.

* نویسنده مسئول مکاتبات

na_gharahi@yahoo.co.uk

nasrin.gharahi@nres.sku.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد است.

اکسیژن رقابت به وجود می‌آید (Hillel, 1980). تنفس و زیتوده میکروبی را می‌توان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و شاخص‌ها در امر تحول و تکامل خاک دانست که می‌تواند بر فرآیندهای مهم اکوسیستم نظیر چرخه جهانی کربن، چرخه عناصر غذایی و اصلاح زیستی اثر بگذارند (Ayustin *et al.*, 2004).

با این حال، اکوسیستم‌های خاکی با چالش‌های جدی مواجه هستند که می‌تواند عملکرد میکروارگانیسم‌ها و کیفیت خاک را تحت تأثیر قرار دهد. آلودگی خاک ناشی از فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی ناپایدار، و استفاده بی‌رویه از کودها و سموم شیمیایی باعث تجمع مواد سمی و کاهش تنوع زیستی میکروارگانیسم‌ها می‌شود. کاهش تنوع زیستی خاک، به‌ویژه کاهش جمعیت میکروارگانیسم‌های مفید، می‌تواند به ضعف در چرخه مواد مغذی، کاهش حاصلخیزی و آسیب‌پذیری بیشتر اکوسیستم‌ها منجر شود. علاوه بر این، تغییرات اقلیمی و تخریب فیزیکی خاک مانند فرسایش، ساختار خاک را تخریب کرده و باعث کاهش ظرفیت آن در حفظ آب و مواد مغذی می‌شود. مواجهه با این چالش‌ها نیازمند شناخت عمیق‌تر از اکوسیستم‌های خاکی و توسعه روش‌های مدیریت پایدار برای حفظ سلامت خاک و افزایش عملکرد کشاورزی است.

بیوپار، ماده‌ای آلی جامد است که از کربونیزه شدن بقایای گیاهی، فضولات دامی و ضایعات کشاورزی در شرایط کم‌اکسیژن تولید می‌شود و به عنوان اصلاح‌کننده پایدار خاک شناخته می‌شود. این ماده می‌تواند خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را بهبود دهد و سلامت و عملکرد گیاهان و اکوسیستم‌های وابسته را ارتقا بخشد. اثرات بیوپار بر تنوع زیستی ریزجانداران خاک به عوامل مختلفی مانند نوع مواد اولیه، شرایط تولید و نوع خاک بستگی دارد (Keiluweit, 2010; Bracmort, 2009). بیوپار، زغالی است که طی فرآیند ترموشیمیایی از زیست‌توده تولید می‌شود و از ویژگی‌هایی چون چگالی کم، سطح تماس زیاد، ظرفیت تبادل کاتیون و ساختار متخلخل برخوردار است که نیمه عمر طولانی برای تجزیه دارد (Moses *et al.*, 2011; Lehmann *et al.*, 2006; Lehmann *et al.*, 2005). خواص بیوپار شامل قابلیت هدایت الکتریکی، اسیدیته، میزان کربن آلی و مواد معدنی است که تحت تأثیر شرایط گرماکافت و مواد اولیه متغیر است (Sato *et al.*, 2019). کربن بیوپار در چهار دسته از نظر پایداری معدنی طبقه‌بندی می‌شود که شامل کربن فوق متحرک تا کربن پایدار است که بیش از صد سال در خاک باقی می‌ماند (Bourke *et al.*, 2007). بیوپار با فرآیندهای پیرولیز، کربونیزاسیون و گازسازی تولید می‌شود و برخلاف زغال سوختی، به عنوان اصلاح‌کننده خاک و ترسیب کربن کاربرد دارد (Verheijen *et al.*, 2010; جهانگیرفر و همکاران، ۱۴۰۴).

استفاده از بیوپار در خاک می‌تواند عملکرد محصولات کشاورزی به‌ویژه در خاک‌های اسیدی را بهبود دهد، حاصلخیزی خاک را افزایش دهد و به مدیریت خاک تالاب‌ها کمک کند. همچنین بیوپار می‌تواند چرخه‌های غذایی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و رشد گیاهان آبی را تحت تأثیر قرار دهد (Baiaimonte *et al.*, 2017; Sato *et al.*, 2019). به دلیل خاصیت جذب بالا، بیوپار می‌تواند آلاینده‌ها و فلزات سنگین خاک تالاب‌ها را کاهش داده و نقش مهمی در تصفیه زیستی و کاهش آلودگی ایفا کند. به‌کارگیری بیوپار در احیای تالاب‌ها باعث بهبود کیفیت خاک و آب، افزایش تنوع زیستی میکروبی و گیاهی و پایداری اکوسیستم‌های تالابی می‌شود (Beesley *et al.*, 2011). سرمستی و ارشدی (۱۴۰۱) بیان کردند که مصرف زغال زیستی سبب افزایش معنی‌دار میزان کربن آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی، کاتیون‌های تبدالی فسفر قابل جذب و نیتروژن نسبت به نمونه شاهد شد. در خاک اسیدی زغال زیستی پوست پسته سبب افزایش قابل توجهی در مقدار فسفر قابل جذب و پتاسیم و منیزیم قابل عصاره‌گیری، کلسیم، منیزیم و سدیم تبدالی و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک گردید. زغال زیستی سبوس برنج سبب افزایش نیتروژن و کلسیم خاک شد، اما زغال زیستی بقایای راش مقدار کربن آلی و pH خاک را افزایش داد. نتایج نشان داد بالاترین هدر رفت کربن به صورت دی‌اکسید کربن در خاک اسیدی از خاک تیمار شده با ۴ درصد زغال زیستی راش مشاهده شد و پایین‌ترین هدررفت کربن در خاک تیمار شده با ۲ درصد زغال زیستی سبوس برنج بود. ابراهیمی و همکاران (۱۴۰۱) نشان دادند که بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه در ترکیب ورمی کمپوست و بیوپار مشاهده شد. همچنین بیشترین تعداد میوه در بوته، عملکرد کل و کارایی مصرف آب در اثر مصرف بیوپار خرما دیده شد. بیوپار کاه و کلش گندم، یکی از انواع بیوپارهای زیستی است که از پیرولیز بقایای کشاورزی گیاه گندم (شامل ساقه، برگ و سایر اجزای غیر دانه‌ای) در شرایط دمایی بالا و حضور محدود یا بدون اکسیژن تولید می‌شود. این نوع بیوپار به دلیل در دسترس بودن گسترده مواد اولیه، هزینه پایین تولید و ویژگی‌های شیمیایی مطلوب، گزینه‌ای مناسب برای استفاده به عنوان اصلاح‌کننده خاک به‌شمار می‌رود. بیوپار حاصل از کاه و کلش گندم معمولاً دارای درصد بالایی از کربن آلی پایدار، ظرفیت نگهداشت

آب مناسب، تخلخل زیاد و pH قلیایی است که می‌تواند به بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک کمک کند. با وجود این، تحقیقات در مورد اثرات بیوپچار کاه و کلش گندم بر خاک و ریزجانداران هنوز محدود است. بیوپچار می‌تواند محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسم‌های مفید ایجاد کند که منجر به بهبود کیفیت خاک و افزایش دسترسی گیاهان به عناصر مغذی می‌شود. همچنین ممکن است نفوذ ریشه و دسترسی به آب و مواد مغذی را تسهیل کند. هدف کلی این تحقیق بررسی اثرات بیوپچار حاصل از کاه و کلش گندم بر خصوصیات مختلف خاک و رشد گیاهان است. در این راستا، پژوهش حاضر به تحلیل تغییرات فیزیکی خاک، بررسی ویژگی‌های شیمیایی خاک مانند کربن آلی پایدار، pH و عناصر غذایی، و مطالعه نقش بیوپچار در بهبود شاخص‌های زیستی خاک از جمله تنوع و جمعیت ریزجانداران و زیست‌توده میکروبی می‌پردازد. همچنین اثر کاربرد بیوپچار بر رشد و نمو گیاهان در خاک‌های با بافت متوسط مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. نتایج این تحقیق می‌تواند به روشن شدن مکانیسم‌های اثر بیوپچار در ارتقای کیفیت خاک و پایداری نظام‌های زراعی کمک کند و در نهایت موجب افزایش بهره‌وری منابع خاک در کشاورزی پایدار شود.

مواد و روش‌ها

به‌منظور انجام آزمایش، تلاش شد از خاکی با بافت متوسط و ویژگی‌های نسبتاً یکنواخت استفاده شود. بر این اساس، خاک لومی به عنوان بافت هدف انتخاب گردید. نمونه‌برداری از خاک یک زمین کشاورزی واقع در منطقه قنداب (با مختصات جغرافیایی $X=490426.919$ و $Y=3572092.611$) در فروردین ۱۴۰۳ انجام شد. پس از برداشت، خاک به آزمایشگاه منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد منتقل گردید تا مراحل آماده‌سازی و آزمون‌های اولیه بر روی آن صورت گیرد. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه و آزمایشگاه بیولوژی خاک دانشگاه شهرکرد اجرا شد. دو عامل مورد بررسی شامل: عامل اول: سطوح بیوپچار (۰، ۱، ۳ و ۵ درصد وزنی) و عامل دوم: حضور یا عدم حضور گیاه چاودار وحشی (*Secale montanum*). برای هر تیمار، ۳ تکرار در نظر گرفته شد. بنابراین در مجموع ۸ تیمار 3×3 تکرار = ۲۴ واحد آزمایشی اجرا شد. جزییات تیمارها در جدول زیر آمده است (جدول ۱)

جدول ۱: تیمارهای تهیه شده.

تیمار	درصد بیوپچار	حضور گیاه	تعداد تکرار
T1	۰% ۴۰۰ گرم خاک	دارد	۳
T2	۱% ۴۰۰ گرم خاک	دارد	۳
T3	۳% ۴۰۰ گرم خاک	دارد	۳
T4	۵% ۴۰۰ گرم خاک	دارد	۳
T5	۰% ۴۰۰ گرم خاک	ندارد	۳
T6	۱% ۴۰۰ گرم خاک	ندارد	۳
T7	۳% ۴۰۰ گرم خاک	ندارد	۳
T8	۵% ۴۰۰ گرم خاک	ندارد	۳
تعداد کل نمونه‌ها			۲۴

پس از پایان دوره آزمایش، پس از گذشت دو ماه که طول دوره رشد گیاه بود، اثر بیوپچار با درصد‌های وزنی مشخص بر خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک و همچنین بر میزان تنوع و توزیع میکروارگانیسم‌ها، میزان رشد گیاه چاودار و مقایسه آن‌ها با نمونه‌های شاهد مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای تعیین بافت خاک از روش هیدرومتری (غازان شاهی، ۱۳۸۵؛ Hazelton and Murphy, 2007) و اسیدیته خاک مورد مطالعه در سوسپانسیون ۱ به ۵ خاک به آب و با استفاده از دستگاه pH متر (Richards, 1954) اندازه‌گیری شدند. مقادیر کربن زیست‌توده میکروبی MBC (Microbial biomass carbon) از روش تدخین-عصاره‌گیری (جورگنس، ۱۹۹۵)، تنفس جمعیت میکروبی خاک براساس اندازه‌گیری میزان دی‌اکسیدکربن (CO_2) حاصل از فعالیت کاتابولیکی جمعیت میکروبی (Anderson and Domsch, 1990) و جمعیت باکتری‌های خاک با تهیه سری رقت‌های متوالی و انجام کشت میکروبی، و

سیس با استفاده از جدول حداکثر تعداد ممکن (Most Probable Number) MPN محاسبه و بر حسب تعداد باکتری در هر گرم خاک (Wallom, 1982; Kucey, 1983) اندازه‌گیری شدند. شاخص‌های غنا و تنوع به ترتیب، توسط شاخص غنای منهینیک (رابطه ۱) و شاخص تنوع شانون-وینر (رابطه ۲) محاسبه شد (Thukral, 2017).

$$\text{Minhinick} = \frac{S}{\sqrt{N}} \quad \text{رابطه (۱)}$$

که N تعداد افراد و S تعداد گونه‌هاست.

$$\text{Shannon} = \sum_i^S (P_i)(\log_2 P_i) \quad \text{رابطه (۲)}$$

که در رابطه بالا P_i نسبت افراد یا گونه i به کل گونه‌هاست.

برای آماده‌سازی بیوپار، مقدار مشخصی از کاه و کلش گندم در لوله‌های فلزی استوانه‌ای درب‌دار قرار داده می‌شود و محتویات آن کاملاً فشرده می‌گردد تا شرایط کم‌اکسیژن فراهم شود. درب ظرف و کوره به‌طور کامل بسته می‌شود و کوره در دمای ۳۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳ ساعت بیوپار تولید می‌کند. انتخاب دما به دلیل نتایج تحقیقات Yang و Lau (2004) است که نشان می‌دهد دماهای زیر ۳۰۰ درجه نمی‌توانند همه مواد آلی را به بیوپار تبدیل کنند و دماهای بالای ۷۵۰ درجه، عملکرد بیوپار را کاهش می‌دهند. در نهایت، بیوپار آماده‌شده از الک ۲ میلی‌متری عبور داده می‌شود.


برای انجام این آزمایش، ۳۶ ظرف با زهکش تهیه شد و برای هر ظرف ۴۰۰ گرم خاک که از الک ۲ میلی‌متری عبور داده شده بود، در نظر گرفته شد. بعد از آن، بیوپارهای الک شده در درصدهای ۱، ۳ و ۵ درصد به خاک اضافه گردید و ۶ ظرف به‌عنوان شاهد بدون بیوپار اختصاص داده شد. در هر ظرف، ۱۰ بذر در عمق ۲-۳ سانتی‌متری خاک و با فواصل مشخص قرار داده شد. پس از آماده‌سازی تیمارها، خاک به مدت یک هفته استراحت داده شد تا به شرایط پایدار برسد. در طول دوره رشد گیاه که به مدت دو ماه به طول انجامید، اثر سطوح مختلف بیوپار بر عملکرد گیاه چاودار و همچنین بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان دوره رشد، ارتفاع هر بوته به‌صورت جداگانه اندازه‌گیری شد. سپس کل بوته‌ها به‌آرامی از خاک خارج گردیده و وزن‌تر آن‌ها با استفاده از ترازوی دیجیتال ثبت شد. برای اندازه‌گیری وزن خشک، نمونه‌های گیاهی درون آون (کوره) با دمای ثابت قرار داده شدند و پس از رسیدن به وزن ثابت، وزن خشک آن‌ها نیز ثبت گردید. علاوه بر داده‌های رشدی گیاه، اندازه‌گیری‌های تکمیلی بر روی نمونه‌های خاک شامل pH، هدایت الکتریکی (EC) و میزان تنفس میکروبی نیز انجام شد تا اثر بیوپار بر وضعیت کلی خاک به‌طور دقیق‌تری تحلیل شود.

برای مقایسه خصوصیات شیمیایی خاک و تنفس میکروبی، تنوع زیستی خاک، وزن تر بوته، وزن خشک بوته و ارتفاع بوته تحت تیمارهای مورد بررسی از تجزیه واریانس یک‌طرفه (one-way ANOVA (Duncan)) استفاده شد. پیش از انجام تحلیل آماری، مفروضات اولیه شامل نرمال بودن توزیع داده‌ها و همگنی واریانس‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی نرمال بودن، از آزمون‌هایی نظیر شاپیرو-ویلک یا کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد و نتایج نشان‌دهنده توزیع نرمال داده‌ها بودند. همچنین، به منظور بررسی همگنی واریانس‌ها از آزمون لون بهره گرفته شد که نتایج آن نشان داد فرض همگنی واریانس‌ها برقرار است. بر این اساس، شرایط لازم برای ادامه تحلیل‌های آماری فراهم بود و تحلیل‌ها بر اساس این پیش‌فرض‌ها انجام شدند. تمامی تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزار SPSS V.22 و برای ترسیم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد.

نتایج


در این مقایسه، افزایش وزن تر گیاه بین تیمار شاهد و تیمار حاوی ۱ درصد بیوپار مشاهده شد (شکل ۱) و به‌طور کلی با افزایش سطح بیوپار، روند افزایشی در وزن تر گیاه نیز نمایان گردید. با این حال، اگرچه تفاوت میان تیمارها از نظر عددی محسوس بود، اما این تغییرات از لحاظ آماری در سطح معنی‌داری ($p < 0.05$) قرار نگرفت. این موضوع می‌تواند ناشی از عواملی مانند مدت‌زمان محدود آزمایش، واریانس بالا در داده‌ها یا ظرفیت بالقوه خاک برای تأمین عناصر غذایی بدون نیاز فوری به بیوپار باشد. همچنین، ممکن است در سطوح پایین‌تر

بیوچار، غلظت مواد مغذی آزادشده و تأثیرات فیزیولوژیکی آن هنوز به حدی نرسیده باشد که منجر به تغییرات معنی دار آماری در شاخص های رشد گیاه گردد. بنابراین، هرچند روند نتایج افزایش وزن تر را با افزایش بیوچار نشان می دهد، اما برای تأیید قطعی این رابطه نیاز به تکرار آزمایش در شرایط میدانی، مدت زمان طولانی تر و با اندازه نمونه بزرگ تر وجود دارد.




شکل ۱: مقایسه اثر بیوچار بر وزن تر بوته. حروف کوچک مشابه نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار در سطح ۵ درصد ($p \geq 0/05$) بر اساس آزمون دانکن است.

نتایج مقایسه وزن خشک بوته ها نیز در تیمار شاهد و سطوح مختلف بیوچار در شکل ۲ ارائه شده است. در اینجا، تفاوت قابل توجهی بین تیمار شاهد و تیمار با ۱ درصد بیوچار مشاهده می شود و با افزایش درصد بیوچار، وزن خشک نیز افزایش می یابد. تیمار با ۵ درصد بیوچار بالاترین وزن خشک را نسبت به سایر تیمارها ثبت کرده است. همچنین، مقایسه میانگین ها، اختلاف معنی داری بین تیمارها (اثر بیوچار بر وزن خشک بوته) نشان می دهد (شکل ۲). در شکل های ۳ تا ۸ حروف کوچک مشابه نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار در سطح ۵ درصد ($p \geq 0/05$) بر اساس آزمون دانکن است.




شکل ۲: مقایسه اثر بیوچار بر وزن خشک بوته

مقایسه تغییرات ارتفاع بوته ها در تیمار شاهد و تیمارهای حاوی بیوچار در شکل ۳ ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که بیوچار تأثیر مثبتی بر ارتفاع بوته ها دارد. به خصوص، در تیمار حاوی ۱ درصد بیوچار نسبت به تیمار شاهد، افزایش معنی داری در ارتفاع بوته ها مشاهده شده است. با افزایش بیوچار به ۳ درصد و ۵ درصد، افزایش بیشتری در ارتفاع ثبت شده و تیمار با ۵ درصد بیوچار بالاترین افزایش را نشان می دهد. مقایسه میانگین ها اختلاف معنی داری بین تیمار شاهد و سطوح ۵ درصد بیوچار نشان می دهد (شکل ۳).




شکل ۳: مقایسه اثر بیوپار بر ارتفاع بوته

مقایسه pH در تیمار شاهد و تیمارهای بیوپار ۱ درصد، ۳ درصد و ۵ درصد نشان داد که pH با افزایش درصد بیوپار افزایش می‌یابد. تغییرات pH در تیمارهای حاوی گیاه بیشتر از تیمارهای بدون گیاه بود (شکل ۴). تیمار شاهد در نمونه‌های حاوی گیاه و همچنین در نمونه‌های بدون گیاه (با تیمارهای ۳ درصد و ۵ درصد) دارای اختلاف معنی‌دار با سطوح دیگر بیوپار بود.




شکل ۴: مقایسه اثر بیوپار بر pH

در تحقیق حاضر، مقایسه تغییرات EC در تیمار شاهد و تیمارهای حاوی بیوپار ۱ درصد، ۳ درصد و ۵ درصد نشان داد که با افزودن ۱ درصد بیوپار، EC افزایش می‌یابد و این افزایش با ۳ درصد و ۵ درصد بیشتر می‌شود، به‌طوری‌که تیمار ۵ درصد بالاترین EC را دارد (شکل ۵). سطح معنی‌داری برای تیمارهای حاوی گیاه و بدون گیاه نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار در هر دو حالت است ($p < 0.05$). نتایج میانگین‌ها نشان می‌دهد که در نمونه حاوی گیاه، تیمار شاهد با سطوح ۳ درصد و ۵ درصد بیوپار و در نمونه بدون گیاه، تیمار شاهد با تمامی سطوح بیوپار اختلاف معنی‌دار دارند ($p < 0.05$).



شکل ۵: مقایسه اثر بیوچار بر EC

مقایسه کربن آلی در تیمار شاهد و تیمارهای حاوی بیوچار (۱درصد، ۳ درصد و ۵ درصد) نشان داد که بیوچار تأثیر مثبت و افزایشی بر کربن آلی دارد. تغییرات کربن آلی در نمونه‌های بدون گیاه بیشتر از نمونه‌های دارای گیاه بود. سطح معنی‌داری ($p < 0.05$) در هر دو حالت بیانگر اختلاف معنی‌دار بین تیمار شاهد و سطوح ۳ درصد و ۵ درصد بیوچار است (شکل ۶).




شکل ۶: مقایسه اثر بیوچار بر درصد کربن آلی

در تحقیق حاضر، تغییرات تنفس بوته‌ها در تیمار شاهد (بدون بیوچار) و تیمارهای حاوی سطوح مختلف بیوچار (۱درصد، ۳ درصد و ۵ درصد) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش سطح بیوچار، تنفس افزایش می‌یابد، این تغییرات در تیمارهای دارای گیاه بیشتر از تیمارهای بدون گیاه بوده است. از نظر میکروبی، نرخ تنفس خاک از $0.12 \text{ mg CO}_2/\text{gr.day}$ در سطح ۱ درصد به $0.16 \text{ mg CO}_2/\text{gr.day}$ در سطح ۳ درصد افزایش یافت. نتایج میانگین‌ها نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌دار در همه سطوح استفاده از بیوچار است (شکل ۷-الف).

تغییرات جمعیت میکروبی بوته‌ها در تیمار شاهد (بدون بیوچار) و تیمارهای حاوی سطوح مختلف بیوچار (۱درصد، ۳ درصد، ۵ درصد) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش سطح بیوچار، جمعیت میکروبی به طور کلی افزایش می‌یابد، اما این تغییرات در تیمارهای دارای گیاه بیشتر از تیمارهای بدون گیاه بوده و از نظر آماری اثر بیوچار بر جمعیت میکروبی معنادار نبوده است (شکل ۷-ب). همچنین، شاخص شانون-وینر نیز با افزایش بیوچار بهبود یافته، اما در هیچ‌یک از سطوح، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشده است. علاوه بر این، تغییرات شاخص غنا منهینیک نیز با افزایش بیوچار مشاهده شده است و تیمار با ۵ درصد بیوچار بالاترین افزایش را داشته است. در اینجا نیز، تغییرات شاخص در نمونه‌های حاوی گیاه بیشتر بوده و اثر بیوچار بر نمونه‌های حاوی گیاه از لحاظ آماری معنی‌دار است، در حالی که در نمونه‌های

بدون گیاه این اختلاف وجود ندارد. به‌طور کلی، نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت بیوچار بر شاخص‌های میکروبی و تنوع‌زستی است، با این حال، تغییرات ثبت شده به لحاظ آماری در برخی موارد معنی‌دار نمی‌باشند (شکل ۷-ج و د).



شکل ۷: مقایسه اثر بیوچار بر (الف) تنفس پایه، (ب) جمعیت میکروبی، (ج) شاخص شانون-وینر و (د) شاخص منهنیک

بحث و نتیجه‌گیری

افزودن بیوچار به‌طور معناداری باعث افزایش pH خاک شد. این اثر در همه سطوح بیوچار مشاهده گردید، اما در تیمار 5% به بالاترین حد خود رسید. افزایش pH می‌تواند ناشی از حضور کربنات‌ها و بی‌کربنات‌های سطحی، ترکیبات معدنی بازی در ساختار بیوچار، و ظرفیت تبادل کاتیونی بالا باشد که به خنثی‌سازی اسیدیته خاک کمک می‌کنند. در نمونه‌های حاوی گیاه چاودار، اثر بیوچار بر pH چشمگیرتر بود که می‌تواند به افزایش ترشحات ریشه‌ای، تحریک فعالیت‌های میکروبی و افزایش مصرف یون‌های اسیدی مرتبط باشد. مطالعات پیشین نیز این یافته‌ها را تأیید می‌کنند. به عنوان مثال، Steinbeiss *et al.* (2009) نشان دادند که بیوچار با بهبود شرایط شیمیایی خاک، از جمله افزایش pH، ظرفیت نگهداری آب و جذب عناصر غذایی، موجب ارتقاء کیفیت خاک می‌شود. همچنین، Cui *et al.* (2013) گزارش کردند که مصرف بیوچار در دامنه ۱۰ تا ۴۰ تن در هکتار موجب افزایش ۲ تا ۵ درصدی pH در خاک‌های اسیدی شده است. هم‌راستا با این مطالعات، پژوهش حاضر نیز نشان داد که افزودن بیوچار، به‌ویژه در سطوح بالا، اثر خنثی‌کنندگی بالایی بر اسیدیته خاک دارد.

هدایت الکتریکی (EC) به عنوان شاخصی از غلظت کل یون‌های محلول در خاک، تحت تأثیر بیوچار قرار گرفت. داده‌ها نشان دادند که در تیمارهای دارای بیوچار، به‌ویژه سطح ۵٪، EC به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. این افزایش احتمالاً به‌دلیل آزادسازی یون‌های محلول از ساختار بیوچار و افزایش معدنی‌شدن مواد آلی در نتیجه فعالیت‌های میکروبی است. نکته قابل توجه آن است که افزایش EC در تیمارهای دارای گیاه بیش از نمونه‌های فاقد گیاه بود، مگر در سطح 3% که افزایش EC در نبود گیاه بیشتر بود. این تفاوت می‌تواند ناشی از مصرف بیشتر یون‌ها توسط گیاه در تیمارهای دیگر و افزایش تجمع یون‌ها در غیاب جذب گیاهی در سطح 3% باشد. چنین یافته‌هایی نشان‌دهنده تعامل پیچیده بین بیوچار، گیاه و دینامیک شیمیایی خاک است.

فعالیت میکروبی خاک، به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت خاک، در پاسخ به افزودن بیوپچار افزایش یافت. تیمار ۵٪ بیوپچار در حضور گیاه چاودار بیشترین میزان تنفس میکروبی را نشان داد که نشان‌دهنده افزایش فعالیت موجودات زنده خاک و ارتقای فرآیندهای بیوشیمیایی مانند تجزیه مواد آلی و تبدیل عناصر غذایی است. افزایش منافذ خاک، فراهمی بهتر آب و هوا، و بهبود ساختار خاک به دلیل وجود بیوپچار، از دلایل این افزایش محسوب می‌شوند. مطالعات (Mahajan et al. (2019 و El-Naggar et al. (2019 نیز تأیید کرده‌اند که بیوپچار با بهبود ویژگی‌های فیزیکی خاک و افزایش ماده آلی، محیط مناسبی برای فعالیتهای میکروبی فراهم می‌کند. این اثر در حضور گیاهان زراعی بیشتر نمایان می‌شود، زیرا ترشحات ریشه‌ای می‌توانند منبع انرژی برای میکروارگانیسم‌ها فراهم آورند.

بررسی‌های میکروبی نشان داد که افزودن بیوپچار موجب افزایش تنوع زیستی خاک می‌شود، به‌ویژه در سطوح بالاتر و در ترکیب با گیاه. در تیمارهای بیوپچار ۳٪ و ۵٪ در حضور گیاه، افزایش قابل توجهی در غنای گونه‌ای و تنوع میکروبی مشاهده شد. این اثر می‌تواند ناشی از افزایش هتروژنی محیط، فراهمی منابع غذایی متنوع‌تر، و پناهگاه‌های فیزیکی بیشتر برای میکروارگانیسم‌ها در ساختار متخلخل بیوپچار باشد. مطالعات قبلی از جمله (Lavelle et al. (2013 و Nsabimana et al. (2004 نیز بر نقش بیوپچار در ارتقاء تنوع میکروبی تأکید داشته‌اند. آن‌ها بیان کرده‌اند که میکروبیوم خاک نه تنها در افزایش حاصلخیزی بلکه در پایداری اکوسیستم‌های زراعی نقش کلیدی دارد. نتایج پژوهش حاضر با مطالعات متعددی هم‌راستا بوده است. برای مثال: (Steinbeiss et al. (2009 و (Nigussie et al. (2012 به اثربخشی بیوپچار در بهبود ویژگی‌های شیمیایی خاک در حضور گیاهان اشاره کرده‌اند. (Bagheri et al. (2020 گزارش دادند که بیوپچار خرما می‌تواند منجر به افزایش وزن تر و خشک اندام‌های گیاهان شود. (Carter et al. (2013 نیز نشان دادند که بیوپچار موجب افزایش تعداد برگ، وزن تر ساقه و عملکرد کاهو و شلتوک برنج می‌شود، به‌ویژه در سطوح بالای بیوپچار. این هم‌راستایی با مطالعات قبلی، بر اعتبار یافته‌های پژوهش حاضر تأکید دارد. با این حال، برخی تفاوت‌ها نیز مشاهده شد که ممکن است ناشی از نوع بیوپچار، شرایط اقلیمی، ترکیب خاک و ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه باشد.

با وجود یافته‌های ارزشمند این تحقیق، برخی محدودیت‌ها وجود دارد که باید در تفسیر و تعمیم نتایج مورد توجه قرار گیرد. نخست، مطالعه حاضر در شرایط کنترل شده گلخانه‌ای و طی یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه (۲ ماه، طول دوره رشد گیاه چاودار) انجام شده است. چنین شرایطی اگرچه امکان کنترل متغیرهای مزاحم را فراهم می‌سازد، اما ممکن است نتایج به‌دست‌آمده را از واقعیت‌های پیچیده و پویای مزرعه‌ای دور کند و قابلیت تعمیم آن‌ها به محیط‌های طبیعی را محدود نماید. همچنین، استفاده از یک نوع خاص خاک در این مطالعه، دامنه تعمیم‌پذیری نتایج را کاهش می‌دهد؛ چرا که واکنش بیوپچار با خاک ممکن است بسته به بافت، pH، مواد آلی اولیه و وضعیت میکروبیوم آن متفاوت باشد. علاوه بر این، تمرکز پژوهش بر یک گونه گیاهی (چاودار) امکان بررسی تفاوت‌های گونه‌ای در پاسخ به بیوپچار را محدود ساخته است؛ در حالی که انواع مختلف گیاهان، بسته به نیازهای تغذیه‌ای، سیستم ریشه‌ای و ترشحات ریشه‌ای، ممکن است واکنش‌های متفاوتی به بیوپچار نشان دهند. با توجه به این محدودیت‌ها، پیشنهاد می‌شود که در مطالعات آینده، آزمایش‌های میدانی بلندمدت (۶ ماه و بیشتر) در شرایط واقعی مزرعه و در اقلیم‌های متنوع انجام گیرد. همچنین، بررسی اثر بیوپچارهای تولیدشده از منابع مختلف زیستی (مانند بقایای چوبی، ضایعات کشاورزی و پسماندهای صنعتی زیستی) می‌تواند به درک بهتر تأثیر منشأ بیوپچار بر عملکرد آن کمک کند. ارزیابی جنبه‌های اقتصادی، محیط‌زیستی و پایداری کاربرد بیوپچار نیز از دیگر زمینه‌های مهمی است که در پژوهش‌های آینده باید مورد توجه قرار گیرد. به‌علاوه، مطالعات آینده می‌توانند با بهره‌گیری از روش‌های مولکولی و ژنومی، به بررسی دقیق‌تر تعاملات بیوپچار با میکروبیوم خاک و تأثیر آن بر چرخه‌های زیستی و زیست جبهانی خاک بپردازند.

منابع

- ابراهیمی، م.، سوری، م.ک.، موسوی، الف.، صاحبانی، ن. ۱۴۰۱. مطالعه اثر ورمی کمپوست و بیوجار بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب بادجان در شرایط مزرعه. مجله علوم باغبانی (۱): صفحات ۳۳-۳۳.
- جهانگیرفر، م.، تیشه زن، پ.، دیوبند هفشجانی، ل. ۱۴۰۴. استفاده از تئوری آنتروپی شانون در بهینه‌سازی سیستم‌های جاذب ستونی برای کاهش COD آب خاکستری، مطالعات علوم محیط زیست، جلد ۱۰ (۱): صفحات ۹۸۶۵-۹۸۷۵.
- سرمرستی، خ.، و ارشدی، ف. ۱۴۰۱. تأثیر زغال زیستی بر ویژگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی در خاک اسیدی و دینامیک کربن آلی خاک، مجله باروری خاک، صفحات ۹۰-۱۰۸.
- Adekiya, A. O., Agbede, T. M., Aboyeji, C. M., Dunsin, O. and Simeon, V. T. 2019. Effects of biochar and poultry manure on soil characteristics and the yield of radish. *Scientia horticulturae*, 243: 457-463.
- Anderson., Traute-Heidi. and K. H. Domsch. 1990. Application of eco-physiological quotients (qCO₂ and qD) on microbial biomasses from soils of different cropping histories. *Soil Biology and Biochemistr*, 22.2: 251-255.
- Bagheri, S., Hassandokht, M. R., Mirsoleimani, A. and Mousavi, A. 2020. Effects of palm leaf biochar on the availability of soil nutrients, leaf nutrient concentration, and physiological characteristics of melon plants (*Cucumis melo* L.) under drought stress. *Acta Agrobotanica*, 73 (1): 1-12.
- Baiamonte, G., Pasquale, C.D., Marsala, V., Cimò, G., Moragues-Saitua, G.L., Arias, G.A. and Bengoetxea, G.N. 2017. Effects of biochar and wood ash on soil hydraulic properties: A field experiment involving contrasting temperate soils. *Geoderma*, 305: 144-152.
- Bourke J., Manley-Harris M., Fushimi C., Dowaki K., Nunoura T. and Antal MJ. 2007. Do all carbonized charcoals have the same chemical structure? A model of the chemical structure of carbonized charcoal. *Industrial and Engineering Chemistry Research*, 46: 5954 -5967.
- Bouyoucos, G. J. 1962. Hydrometer method improved for making particle size analyses of soils. *Agronomy journal*, 54 (5): 464-465.
- Bracmort, K. S. 2009. Biochar examination of an emerging concept to sequester carbon. Congressional Research Service.
- Carter, S., Shackley, S., Sohi, S., Suy, T. and Haefele, S. 2013. The impact of biochar application on soil properties and plant growth of pot grown lettuce (*Lactuca sativa* L.) and cabbage (*Brassica chinensis*). *Agronomy*, 3: 404-418.
- Cui L., Yan J., Yang Y., Li L., Quan G., Ding C., Chen T., Fu Q. and Chang A. 2013. Biochar for heavy metals in soil. *Bioresources*, 8: 5536-5548.
- El-Naggar, A., Lee, S.S., Rinklebe, J., Farooq, M., Song, H., Sarmah, A.K., immerman, A.R., Ahmad, M., Shaheen S.M. and Ok, Y.S. 2019. Biochar application to low fertility soils: a review of current status, and future prospects. *Geoderma*, 337: 536-554.
- Hillel, D. 1980. *Environmental soil physics*, Academic press, 281- 284.
- Hu, Y., Thomsen, T. P., Fenton, O., Sommer, S. G., Shi, W. and Cui, W. 2023. Effects of dairy processing sludge and derived biochar on greenhouse gas emissions from Danish and Irish soils. *Environmental Research*, 216: 114-543.
- Keiluweit, M. 2010. Dynamic molecular structure of plant biomass-derived black carbon (biochar). *Environmental Science and Technology*, 44 (4): 1247-53.
- Kucey, RMN. 1983. "Phosphate-solubilizing bacteria and fungi in various cultivated and virgin Alberta soils." *Canadian Journal of Soil Science*, 63.4: 671-678.
- Landi, L., et al. 2000. Influence of cadmium on the metabolic quotient, L-: D-glutamic acid respiration ratio and enzyme activity: microbial biomass ratio under laboratory conditions. *Biology and fertility of soils*, 32: 8-16.
- Lavelle P., Decaens T., Aubert M., Barot S., Margerie P., Mora P. and Rossi J.P. 2013. Soil invertebrates and ecosystem services. *European Journal of Soil Biology*, 42 (1): 3-15.
- Lehmann J., Gaunt J. and Rondon M. 2006. Bio-char sequestration in terrestrial ecosys-tems – A review. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 11: 395-419.
- Lehmann, J., Gaunt, J., Rondon, M., 2005. Bio- char sequestration in terrestrial ecosystems- a review. *Mitigation and adaptation strategies for global change*.
- Mahajan, N.C., Mrunalini, K., Krishna Prasad, K. S., Naresh, R. K. and Sirisha, L. 2019. Soil Quality Indicators, Building Soil Organic Matter and Microbial Derived Inputs to Soil Organic Matter under Conservation Agriculture Ecosystem: A Review. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 8 (2): 1859-1879.
- Moses, H. D., G. Sai. and B. H. Essel. 2011. Biochar production potential in Ghana: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 15: 3539-3551.

- Nigussie, A., Endalkachew, K., Mastawesha, M. and Gebermedihin, A.** 2012. Effect of biochar application on soil properties and nutrient uptake of Lettuces (*Lactuca sativa*) grown in chromium polluted soils. *American - Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science*, 12: 369 –376.
- Nsabimana, D., Haynes, R.J. and Wallis, F. M.** 2004. Size, activity and catabolic diversity of the soil microbial biomass as affected by land use. *Applied Soil Ecology*, 26 (2): 81-92.
- Richards., Lorenzo Adolph, ed.** 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. No. 60. US Government Printing Office.
- Sato, M.K., de Lima, H.V., Costa, A.N., Rodrigues, S., Pedroso, A. J. S. and de Freitas Maia, C. M. B.** 2019. Biochar from Acai agroindustry waste: Study of pyrolysis conditions. *Waste Management*, 96: 158-167.
- Steinbeiss, S., Gleixner G. and Antonietti, M.** 2009. Effect of biochar amendment on soil carbon balance and soil microbial activity. *Soil Biology and Biochemistry*, 41: 1301 –1310.
- Thukral., Ashwani, K.** 2017. "A review on measurement of Alpha diversity in biology." *Agricultural Research Journal*, 54.1.
- Verheijen, F., Jeffery, S., Bastos, A. C., Van Der Velde, M. and Diafas, I.** 2010. Biochar application to soils: a critical scientific review of effects on soil properties processes and functions. Joint Research Centre Scientific and Technical Reports.
- Yang, F. and Lau, K. M.** 2004. Trend and variability of China precipitation in spring and summer: linkage to sea-surface temperatures. *International Journal of Climatology. A Journal of the Royal Meteorological Society*, 24 (13): 1625-1644.

The Effect of Biochar on Soil Microbial Indicators and Biodiversity and Its Role in Stimulating Plant Growth

Fatemeh Attar Shahraki¹
Nasrin Gharahi^{2*}
Rasool ZamanAhmadmahmoodi²
Saheb Soodaie Mashaie³
Elham Ghehsareh Ardestani⁴
Mohsen Bahmani⁵

1. Master's degree student, Department of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord.

2. Associate Professor, Department of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord.

3. Assistant Professor, Department of Soil Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord.

4. Associate Professor, Department of Natural Engineering, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord.

5. Associate Professor, Department of furniture-industry, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord.

***Corresponding author:**

na_gharahi@yahoo.co.uk
nasrin.gharahi@nres.sku.ac.ir

Received date: **July/08/2025**

Reception date: **December/03/2025**

Abstract

The biodiversity of soil microorganisms is a key indicator for evaluating soil function and identifying contaminants. Biochar, a solid organic material produced from plant residues and agricultural waste under low-oxygen conditions, is recognized as a soil amendment that improves the soil's physical and chemical properties and influences microbial biodiversity. This study investigated the effects of biochar on soil microbial indicators, microbial biodiversity, and the growth of rye plants. For this purpose, biochar was prepared from wheat straw and stubble in an electric furnace and added to 400 grams of loamy soil at concentrations of 0% (control), 1%, 3%, and 5%. Subsequently, 10 rye seeds were planted in some samples, and other samples were prepared without plants. The samples were allowed to rest for two months before soil property measurements. The results showed that the addition of biochar to the soil increased the growth of rye, with increases in the fresh weight, dry weight, and height of the plant. For example, the fresh weight was 0.30 grams in the control sample and reached 0.50 grams at the 5% biochar level. Furthermore, biochar positively affected soil pH and electrical conductivity (EC) parameters, increasing the pH from 7.65 in the control sample to 7.83 at the 1% level. Soil microbial respiration also increased with increasing biochar; the respiration reached 0.12 mg CO₂/g.day at the 1% level and 0.16 mg CO₂/g.day at the 3% level. This study demonstrates that biochar not only increases microbial respiration but also improves the soil's capacity to support plant growth, and the changes in the measured parameters were greater in the samples containing rye plants compared to those without plants.

Keywords: Biochar, Biodiversity, Rye plant, Microbial indicator.